

## **Mupirocin unguent 2%, 3 ml, Farmacia Evofarm**

### **Compozitie:**

Mupirocina calcica 2% (G/G), glicerina anhidra, lanolina anhidra, vaselina alba.

### **Informatii generale**

Mupirocin unguent este un antibiotic topic (local), derivat de acid pseudomononic, activ fata de microorganismele responsabile de anumite infectii cutanate si intranasale sensibile la Mupirocina: ex. *Staphylococcus aureus*, inclusiv tulpinile meticilino-rezistente, alti stafilococi si streptococi sensibili la Mupirocina in urma antibiogramei efectuate in prealabil. De asemenea, poate fi activ fata de germenii gramnegativi, cum sunt *Escherichia coli* si *Haemophilus influenzae*.

### **Dozaj si mod de administrare**

Adulti si copii: Mupirocin unguent se aplica pe zona afectata de trei ori pe zi, timp de 5-10 zile in functie de recomandarea medicala.

### **Contraindicatii**

Hipersensibilitate la Mupirocina sau celelalte substante din baza de unguent (vaselina, lanolina, glicerina)

### **Absorbtie si excretie.**

Mupirocin unguent se absoarbe prin pielea intacta, dar rata absorbtiei sistemice pare sa fie joasa. In cazul unei absorbtii sistemice, Mupirocin unguent este rapid metabolizat la metabolitul sau inactiv, acidul monic, care este rapid excretat pe cale renala.

### **Precautii:**

Aceasta formula de Mupirocin unguent nu este indicata pentru uz oftalmic, produsul se poate folosi doar intranasal sau cutanat. Cand Mupirocin unguent se aplica pe fata, trebuie evitat contactul cu ochii. Mupirocin unguent trebuie folosit cu prudinta in afecțiuni renale moderate sau severe.

### **Sarcina si alaptarea**

Studii pe animale de laborator nu au evidențiat efecte teratogene. Totusi, NU exista date clare privind siguranta administrarii de Mupirocin unguent in cursul sarcinii.

Se va folosi in timpul sarcinii sau alaptarii doar la recomandarea medicului.

**Reactii adverse:**

Studiile clinice au relevat unele reactii adverse minore limitate la locul aplicarii, cum ar fi: senzatie de arsura, usturime si prurit.

La utilizarea prelungita, pot aparea unele infectii fungice.

**Forma de prezentare:**

Mupirocin unguent: Seringi dozatoare din chihlimbar de 3 ml.

**Conditii de pastrare:**

Se pastreaza la frigider intre 2-8 grade Celsius. Dupa deschidere a se pastra la loc racoros (sub 25 grade Celsius) ferit de lumina. A nu se lasa la indemana copiilor.

**Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe sa utilizati Mupirocin unguent. Daca aveti nelamuriri sau daca aveti nevoie de mai multe informatii sau sfaturi, adresati-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.**

**Acest prospect are un scop informativ, produsul este preparat in Laboratorul Farmaciei Elite Greenpharm din Sos. Oltenitei 51-55 de catre farmacistii specialisti.**